



Etiquette patient

Médecin prescripteur

Centre demandeur

DDN :
Homme ☐ Femme ☐

Date du Prélèvement : _ _ / _ _ / _ _ effectué par heure :

Nature du prélèvement

- | | |
|---|--|
| ☐ autoprélèvement vaginal (APV) pour recherche IST (eSwab) | ☐ prélèvement anal (eSwab) |
| ☐ autoprélèvement vaginal (APV) pour détection HPV* (eNAT) | ☐ prélèvement pharyngé (eSwab) |
| ☐ urines (homme pour PCR IST) | ☐ sang tube sec (bouchon jaune foncé) |
| ☐ urétral chez l'homme si écoulement pour culture (eSwab) | ☐ sang EDTA (bouchon violet=bv) |
| ☐ autre : | ☐ sang EDTA (bv) plasmathèque* |

*dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes ≥ 30 ans n'ayant pas eu de frottis depuis plus de 3 ans

Renseignements cliniques

- ☐ Patient symptomatique ☐ Patient asymptomatique Date derniers rapports
- ☐ Ecoulement ☐ Ulcération ☐ autre
- ☐ Suivi après traitement , traitement reçu :
- ☐ Suspicion de primo-infection HIV : date de la dernière prise de risque présumée :

Analyses demandées

2 tubes secs nécessaires pour une analyse mais suffisants pour réaliser l'ensemble des sérologies

- ☐ HIV : dépistage (sérologie et si +, ARN viral : 2 tubes secs **+ 2 EDTA plasmathèque***)

Si TROD fait, résultat :

- ☐ HIV : contrôle (ELISA, 2 tubes secs) ☐ Charge virale (2 EDTA)

Si antécédents, n° dossier laboratoire :

- ☐ Hépatite A : HAV IgG seul (2 tubes secs)

- ☐ Hépatite C : HCV dépistage (sérologie et si +, ARN viral : 2 tubes secs **+ 2 EDTA plasmathèque***)

- ☐ Hépatite B : HBV dépistage : Ag HBs, Ac anti-HBc, Ac anti-HBs (2 tubes secs)

- ☐ Hépatite B : HBV charge virale (3 EDTA)

- ☐ Syphilis : dépistage/suivi (2 tubes secs)

- ☐ HPV dépistage primaire (APV en milieu eNAT, femmes ≥ 30 ans sans frottis depuis 3 ans, hors règles)

➤ **REMPLIR OBLIGATOIREMENT LE BON SPECIFIQUE +++**

- ☐ PCR IST asymptomatique* : *C. trachomatis*, *Gonocoque*, *M genitalium* (eSwab)

- ☐ PCR IST symptomatique** : *C. trachomatis*, *Mycoplasmes urogénitaux*, *Gonocoque*, *T. vaginalis* (eSwab)

*urines pour hommes, APV pour femmes ; **urines (**ou** urètre en cas d'écoulement) pour homme, APV pour femmes

- PCR IST ☐ pharynx ☐ anal : *C. trachomatis*, *Gonocoque*, *Mycoplasma genitalium* (eSwab)

- ☐ CULTURE GONOCOQUE (Bactériologie) (urètre pour homme, APV pour femmes) à prescrire **en plus de la PCR IST si symptômes (eSwab)**

- ☐ Herpès génital, si lésions (vésicules-érosions-ulcérations) : PCR (eSwab ou UTM ou eNAT)

- ☐ Diagnostic grossesse (HCG) (1 tube hépariné gélosé) Date dernières règles :